

# 子宮頸がん予防ワクチン接種後の体調変化に関するアンケート結果


調査期間 平成27年10月22日～11月16日

接種者数(送付者数) 3,105人  
 回答数 1,182通  
 回答率 38.1%

問1 現在までに、子宮頸がん予防ワクチンを何回接種しましたか。

(人)					
選択肢	接種回数	サーバリックス	ガーダシル	ワクチン名不明	合計
1	1回	39	10	23	72
2	2回	62	17	29	108
3	3回	782	147	68	997
合計		883	174	120	1177

未記入5人




問2 接種後、接種が原因ではないかと思われるような体調の変化がありましたか。

(人)					
選択肢	変化の有無	サーバリックス	ガーダシル	ワクチン名不明	合計
1	はい	348	73	33	454
2	いいえ	523	101	80	704
合計		871	174	113	1158

未記入24人

※「いいえ」と答えた方は問6へ



問3 それは、どのような症状でしたか。


(複数回答)

(人)

選択群	症状	サーバリックス	ガーダシル	ワクチン名不明	合計
1	接種部位の痛み・かゆみ	266	51	28	345
2	接種部位のはれ・あかみ	196	45	21	262
3	だるさ・疲労感・脱力感	80	17	12	109
4	頭痛	26	4	10	40
5	発熱	33	0	8	41
6	湿疹	4	3	2	9
7	めまい	15	4	4	23
8	失神	4	1	1	6
9	手足の痛み	31	3	1	35
10	生理不順	18	6	3	27
11	吐き気	18	6	2	26
12	しびれ	27	3	0	30
13	その他	66	14	47	127

※その他

- ・腕があがらない程の痛み、筋肉痛
- ・腹痛
- ・腕、足のけいれん
- ・腰痛
- ・記憶の喪失、暗算ができない
- ・歩行障害
- 等




#### 問4 その後、症状の変化はありましたか。

(人)					
選択肢	症状の変化	サーバリックス	ガーダシル	ワクチン名不明	合計
1	症状はその日のうちになくなった	30	11	6	47
2	症状は続いたがその後なくなった				
	①1週間以内	195	35	22	252
	②1週間～1ヶ月	62	7	2	71
	③1～3ヶ月	12	2	0	14
	④3ヶ月以上	2	2	0	4
	⑤覚えていない	12	4	3	19
3	現在も継続している	23	6	0	29
4	その他	5	0	15	20


※その他

- ・原因のわからない頭痛、だるさ、めまいなど時々おこる
- ・今も痛みがあり、正座もできない状態 等



#### 問5 症状がでた際に医療機関を受診されましたか。

(人)					
選択肢	受診状況	サーバリックス	ガーダシル	ワクチン名不明	合計
1	受診した(治療終了)	24	6	2	32
2	受診した(治療継続中)	15	1	0	16
3	受診していない	277	57	30	364



問6 調査内容または子宮頸がん予防ワクチンについて、ご意見・ご要望等をご記入ください。  
【自由意見の主な内容】

- ・今は大丈夫だが、これから症状がでないか
- ・安全なワクチンを開発してほしい
- ・対応が遅い
- ・アンケート調査の結果を早く公表してほしい
- ・接種時、とにかく痛かった
- ・安全・安心が確保されれば接種したい
- ・症状についての因果関係を明らかにしてほしい
- ・副反応で苦しんでいる方に誠意ある対応をしてほしい
- ・接種後の症状が副反応によるものかどうか分からない
- ・ワクチン接種の効果はあるのか 等